

DFP-Literaturstudium

Bitte beachten Sie:

Im Rahmen des Diplom-Fortbildungsprogramms ist es möglich, durch das Literaturstudium in den Schmerz Nachrichten Punkte für das DFP zu erwerben.

So machen Sie mit:

Entsprechend den Richtlinien der ÖÄK finden Sie im Anschluss an den Fortbildungsartikel Multiple-Choice-Fragen. Eine Frage gilt dann als richtig beantwortet, wenn Sie von den vorgegebenen Antworten alle richtigen angekreuzt haben. Für eine positive Beantwortung ist erforderlich, dass Sie vier der sechs Fragen richtig beantworten. Bei korrekter Beantwortung werden zwei DFP-Punkte angerechnet.

E-Mail, Post & Fax:

Schicken Sie diese Seite bitte per E-Mail an monica.friedmann@springer.at, per Post an Springer Medizin Wien (z.Hd. Monica Friedmann), Prinz-Eugen-Straße 8–10, 1040 Wien, oder per Fax an: 01/330 24 26.

Diesen Artikel sowie eine Reihe weiterer Fortbildungsangebote finden Sie auch auf www.pains.at und der Plattform „Akademie Lernwelt“ der Österreichischen Akademie der Ärzte unter www.meindfp.at, wo Sie die Fragen auch online beantworten können.

Ihre Teilnahmebestätigung ist unter www.meindfp.at downloadbar, wenn Sie ein Fortbildungskonto haben.

DFP-Fragen

? Wann kann CRPS bei Berücksichtigung der Diagnosekriterien in der Regel diagnostiziert werden?

- Direkt nach dem Trauma, wenn Patient:innen über Schmerzen und entzündliche Zeichen berichten.
- Vier bis sechs Wochen nach Trauma, wenn vorhandene Schmerzen nicht mehr auf das initiale Trauma zurückzuführen sind.
- Vier bis sechs Wochen nach dem Trauma, wenn die Budapest-Kriterien ein CRPS feststellen lassen.
- CRPS ist eine Ausschlussdiagnose.

? Was gehört laut Budapest-Kriterien nicht zu den klinischen Zeichen bei der Diagnose eines CRPS?

- Starkes Schwitzen
- Veränderung der Hautfarbe
- Temperaturunterschied
- Hyperalgesie
- Pseudoneglect der betroffenen Extremität

? Welche Pharmakotherapie macht in der Akutphase eines CRPS Sinn?

- Biphosphonate
- Kortison
- Vitamin C
- Clonidin

? Welches bildgebende Verfahren kann in der Akutphase zur Differenzialdiagnostik eines CRPS angewendet werden?

- Quantitativ-sensorische Testung
- MRT
- Dreiphasen-Knochenszintigraphie
- Röntgenaufnahme der Extremitäten

? Welche invasiven Verfahren können zur Therapie eines medikamentösen therapierefraktären CRPS der unteren Extremität angewendet werden?

- Lumbale Sympathikusblockaden
- Epidurale Rückenmarksstimulation
- Deep-Brain-Stimulation
- Neurolyse

? Welches physikalische Therapieverfahren verbessert beim CRPS die Funktion der betroffenen Extremität?

- Krafttraining
- Magnetfeldtherapie
- Gleichstromtherapie
- Spiegeltherapie



 Bitte ausfüllen

Absender*in (Bitte gut leserlich ausfüllen)

Name:

Straße/Gasse:

Ort/PLZ:

Arzt/Ärztin für:

Altersgruppe: <30 51-60

31-40 >60

41-50

ÖÄK-Nummer: _____-____