

# DFP E-Learning

Der Nachweis der Teilnahme wird durch das Beantworten der Fragen erbracht, welche sich ausschließlich auf den Inhalt der entsprechenden E-Learning-Fortbildung beziehen.

1. Nach der Lektüre des DFP-Artikels beantworten Sie bitte die Multiple-Choice-Fragen. Eine Frage gilt dann als richtig beantwortet, wenn alle möglichen richtigen Antworten angekreuzt sind. Bei positiver Bewertung (66 Prozent der Fragen) werden Ihnen zwei DFP-Punkte für das Sonderfach „Anästhesiologie und Intensivmedizin“ zuerkannt.
2. Schicken Sie diese Seite entweder per Post, Fax oder E-Mail an die Redaktion von Springer Medizin Wien (z. Hd. Monica Friedmann), Prinz-Eugen-Straße 8-10, 1040 Wien, Fax: 01/330 24 26 E-Mail: monica.friedmann@springer.at
3. Einsendeschluss: **Februar 2024**
4. Internet: Sie haben die Möglichkeit, den Fragebogen unter [www.pains.at](http://www.pains.at) herunterzuladen oder unter E-Learning auf der Website der Österreichischen Akademie der Ärzte [www.meindfp.at](http://www.meindfp.at) auszufüllen.

**?** Welche beiden Dermatome sind von Herpes Zoster-Symptomen am häufigsten betroffen? (2 richtige Antworten)

- a) Trigeminusregion
- b) Sakrale Dermatome
- c) Thorakale Dermatome
- d) Zervikale Dermatome

**?** Wie hoch ist die Inzidenzrate der häufigsten Komplikation Post-Zoster-Neuralgie in den einzelnen Altersgruppen? (2 richtige Antworten)

- a) > 50 Jahre: weniger als zehn Prozent
- b) > 60 Jahre: 50 Prozent
- c) > 70 Jahre: 75 Prozent
- d) Die Inzidenzrate ist in jeder Altersgruppe gleichermaßen verteilt.

**?** Mit welchen Folgen bzw. Veränderungen können Verletzungen peripherer Neurone vergesellschaftet sein? (3 richtige Antworten)

- a) Ektope spontane und evozierte Impulsentstehung
- b) Sympathisch afferente Koppelungen
- c) Es kommt in solchen Fällen zu keinerlei Veränderungen.
- d) Athrophie, Degeneration und Sprossung

**?** Was sind die drei primären Behandlungsziele bei akutem Herpes Zoster? (3 richtige Antworten)

- a) Hemmung der Virusvermehrung
- b) Verhinderung von Narbenbildung
- c) Schmerzlinderung
- d) Verhinderung einer Post-Zoster-Neuralgie

**?** Wann sollte eine kombinierte Gabe von Kortikosteroiden und Virustatika im Falle einer akuten Gürtelrose zum Einsatz kommen? (1 richtige Antwort)

- a) Immer
- b) Ausschließlich im Falle von Herpes zoster oticus mit Befall des Nervus facialis
- c) Bei immuninkompetenten Patient\*innen
- d) Lokal bei Herpes zoster ophthalmicus mit disciformer Keratitis

**?** Welche topischen Therapien sind zur Behandlung peripher induzierter neuropathischer Schmerzen zugelassen? (2 richtige Antworten)

- a) Lidocain-Hydrogelpflaster 5%
- b) Fentanyl-Pflaster mit 25 µg/h
- c) Derzeit ist keine topische Therapie zugelassen, vielmehr kommt es hin und wieder zum Off-label use.
- d) Capsaicin 8%-Pflaster

Bitte ausfüllen

Absender (Bitte gut leserlich ausfüllen)

Frau  Herr

Name .....

Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin

Straße/Gasse .....

Facharzt/-ärztin für .....

Ort/PLZ .....

Ich besitze ein gültiges DFP-Diplom

Telefon .....

Altersgruppe  < 30  41 bis 50  
 31 bis 40  51 bis 60  > 60

ÖÄK-Nummer \_\_\_\_\_

(Die ÖÄK-Nummer wird seit 2007 auf neu ausgestellten ärzteausweisen abgedruckt. Ärzte mit älteren Ausweisen können Sie online unter <http://abfrage.aerztekammer.at> abfragen.)